

Le Pharmacien d'officine

Un garant de la qualité des
médicaments



Un très grand nombre de médicaments mais

- Un secteur licite
- Un secteur illicite

Le marché mondial du médicament n'est
pas un marché garantissant la qualité

Réseau Médicaments et Développement



- Des copies avec des noms modifiés
- Des médicaments sous-dosés volontairement
- Des médicaments de qualité médiocre
- Des médicaments vides (sans principe actif)
- Des médicaments avec erreur de principe actif

Que peut faire le pharmacien dans son officine

Face aux mauvais médicaments et aux faux un contrôle organoleptique nous paraît parfois un acte essentiel

Réseau Médicaments et Développement



Contrôle aussi des étiquetages et des notices d'emploi

Entre autre:
couleur de
comprimé:
permissif !!!!

ALAXIN®

ALAXIN®

Comprimé de Dihydroartémisinine

ACTIF INGRÉDIENT

Huit hydro-3,6,9-triméthyl -3,12-époxy-12H-pyrane -[4,3,-J]
-1,2-benzodiazine-10(3H)-ol.

$C_{15}H_{24}O_5$ (284.36)

COMPOSITION

Chaque Comprimé contient :

Tabellar Dihydroartémisinine 60 mg
Excipients q.s.
Couleur de comprimé Permissif

PROPRIÉTÉS

Efficacité pour la plâsmodium agame rapidité pour contrôler le symptôme et tuer les plasmodiums. Même efficace pour la malaria pernecieuse resistant à la chloroquine et à la pipéraquine. Toxine basse. Reproduction toxique : augmentation de l'absorption foetale pendant la gestation d'une souris. Non mutation effective observée.

PHARMACOCINETIQUES

Voie buccale de Dihydroartémisinine, l'absorption est rapide et extensive, ce qui fait l'effet prompt. Les paramètres de la pharmacothérapie humaine : le dose oral 2mg/kg, $T_{max} = 1.33$ h, $C_{max} = 0.71$ µg/ml, $T_{1/2} = 1.57$ h. Caractère spécifique : absorption prompte, distribution extensive, excrétion et métabolisme rapide.

INDICATION

Toutes sortes de malaria, surtout effectif pour le traitement de malaria pernecieuse et malaria cérébrale qui sont résidence de la chloroquine et de la pipéraquine.

EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun effet nuisible n'est reporté par le dose clinique.

Quelques rares cas de la subsidence temporaire du réticulocyte.

PRECAUTION D'EMPLOI

Aucune preuve d'embryotoxicité et de teratogenicité n'a été rapportée chez l'espèce humaine. Toutesfois, il est conseillé de consulter le médecin pendant la période d'organogenèse.

ENTRÉPOSAGE

Bien étanche, dans un faux-jour, stocker dans une place froide.

EMBALLAGE

Comprimés dans les pellicules vésiculaires

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION DE ADULTE ET ENFANTS

AGE GROUPE	JOUR 1	JOUR 2	JOUR 3	JOUR 4	JOUR 5	JOUR 6	JOUR 7	TOTAL DOSE Mg
ADULTE	120	60	60	60	60	60	60	480
ENFANT:								
ANS. 11-15	90	45	45	45	45	45	45	360
7-10	60	30	30	30	30	30	30	240
4-6	40	20	20	20	20	20	20	160
1-3	30	15	15	15	15	15	15	120
1	20	10	10	10	10	10	10	80

Ne Peut être administré que sous prescription médicale

Fabrique par: GVS LABS.


2, Swamigeha, Dombivli (E) 421201

Fax: +91 251 860 498. E-mail : gvsylabs@hotmail.com

Sous Licence de: GVS LABS.

Georgetown,

Guyana, (South America)



Le laboratoire anglais annoncé n'existe pas

Mission NIGER.

SULPHAMETHOXAZOLE BP 400 mg
TRIMETHOPRIM BP 80 mg
TABLETS 1000

Trimezole®

M.L. No.: AP/DRUGS/93/RR/97/RG/ (L)
Batch No.: T-181
Mfg. Date: SEP-1998
Exp. Date: AUG-2001



No compromise on quality
FORMULATIONS plc, Royal Parade, New Gardens, Sevenoaks TW9 3DD, England

SULPHAMETHOXAZOLE BP 400 mg
TRIMETHOPRIM BP 80 mg
TABLETS 1000

Trimezole®

Each tablet contains
Sulphamethoxazole BP 400 mg
& Trimethoprim BP 80 mg

FOR ORAL USE. To be taken as directed by the Physician.
Store in a cool dry place, below 25°C.
This is a Medicine. KEEP AWAY FROM CHILDREN

Full prescribing information is available
from the address below.



No compromise on quality
FORMULATIONS plc, Royal Parade, New Gardens, Sevenoaks TW9 3DD, England

Contrôle du nom des produits

Réseau Médicaments et Développement



HICONCIL

Amoxicilline

500 mg.

12 gélules



Pharm. Industrie S.p.A.

10138 Roma

Prodotto e confezionato in Italia

HECOCIL

Amoxicillin

500 mg.

12 gélules

Amoxicillin

VAR SOL

ALBENDAZOLE USP

5 comprimés
5 sachets
5 comprimés
400 mg

VERZOL

ALBENDAZOLE USP

5 comprimés
5 sachets
5 comprimés
400 mg



Single Dose

10-15

NEW

ZEMTEL

(Aluminium Hydroxide)

Suspension

The only
treatment for
constipation



Contrôle du contenu

Réseau Médicaments et Développement



Un joli
comprimé
rose au
milieu des
autres!!!!!!



Maalox™

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE CAPLETS, 2 mg

Anti-Diarrheal

New!

Prescription strength

Without a prescription

CONTROLS THE SYMPTOMS
OF DIARRHEA

12 CAPLETS*

* Each caplet (capsule-shaped tablet) contains 2 mg loperamide hydrochloride



Maalox™ Anti-Diarrheal caplets relieve diarrhea for both adults and children 6 years of age and older, in many cases with just one dose. Maalox Anti-Diarrheal caplets contain loperamide HCl, previously available only in a prescription product. This ingredient has been prescribed for millions of people, and has proven to be an exceptionally safe and effective antidiarrheal medication. Maalox Anti-Diarrheal caplets are small and easy to swallow.

INDICATION: Maalox Anti-Diarrheal controls the symptoms of diarrhea.

DIRECTIONS: Drink plenty of clear fluids to help prevent dehydration, which may accompany diarrhea.

Adults and children 12 years of age and older	Take 2 caplets after the first loose bowel movement and 1 caplet after each subsequent loose bowel movement but no more than 4 caplets a day for no more than 2 days.
Children 9-11 years (60-95 LBS)	Take 1 caplet after the first loose bowel movement and 1/2 caplet after each subsequent loose bowel movement but no more than 2 caplets a day for no more than 2 days.
Children 6-8 years (48-59 LBS)	Take 1 caplet after the first loose bowel movement and 1/2 caplet after each subsequent loose bowel movement but no more than 2 caplets a day for no more than 2 days.
Children under 6 years (up to 47 LBS)	Consult a physician. Not intended for use in children under 6 years old.

WARNINGS: DO NOT USE FOR MORE THAN 2 DAYS UNLESS DIRECTED BY A PHYSICIAN. Do not use if diarrhea is accompanied by high fever (above 101°F), or if blood is present in the stool. If you have had a rash or other allergic reaction to loperamide HCl, do not use this product. If you are taking antibiotics or have a history of liver disease, consult a physician before using this product. As with any drug, if you are pregnant or nursing a baby, seek the advice of a health professional before using this product. Keep this and all drugs out of the reach of children. In case of accidental overdose, seek professional assistance or contact a poison control center immediately. **ACTIVE INGREDIENT:** Loperamide HCl 2 mg per caplet. **INACTIVE INGREDIENTS:** Corn starch, lactose, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, FD&C Blue #1 and D&C Yellow #10.

Store between 15°-25°C (59°-77°F).



NIVAQUINE SIROP

Le petit flacon est une copie .L'étiquette porte 150ml ainsi que l'emballage extérieur. Le flacon ne fait que 125ml.

Le contenu est effervescent à l'ouverture. L'étiquette comme l'emballage portent la mention RHONE POULENC



Un grand danger de connexions entre le marché licite et l'illicite

Réseau Médicaments et Développement





Réseau Médicaments et Développement





Réseau Médicaments et Développement



