

Fiche Mémo

Rhinopharyngite aiguë et angine aiguë de l'enfant

Novembre 2016

Le but de cette fiche mémo est de favoriser la prescription appropriée d'antibiotiques, afin de diminuer les résistances bactériennes pouvant conduire à des impasses thérapeutiques. Le choix de l'antibiotique, sa dose et sa posologie sont les éléments à prendre en compte pour une prescription adaptée.

→ **Pas d'antibiotique** chez un enfant :

- ayant une **rhinopharyngite aiguë** ;
- de moins de 3 ans ayant une **angine aiguë** ;
- de 3 ans et plus ayant une **angine aiguë** avec un test diagnostic rapide (TDR) **négatif**.

→ **Chez un enfant de 3 ans et plus** ayant une **angine aiguë** avec un TDR positif :

- amoxicilline, 50 mg/kg/j, pendant 6 jours.
 - ▶ En cas d'allergie aux pénicillines sans contre-indication aux céphalosporines, le traitement recommandé est la cefpodoxime proxétil : 8 mg/kg/j, pendant 5 jours.
 - ▶ En cas de contre-indication aux bêtalactamines, les antibiotiques suivants peuvent être utilisés :
 - azithromycine, 20 mg/kg/j, pendant 3 jours ;
 - clarithromycine, 15 mg/kg/j, pendant 5 jours ;
 - josamycine, 50 mg/kg/j, pendant 5 jours.